

稲作情報 第2号 (育苗後半・田植編)

高温登熟による品質低下を防ぎ、売れる氷見米を生産するため、

コシヒカリの田植は 5月15日を中心に実施しましょう！

※ 中山間地は5月8日頃！

1 田植え間近になりました！ がっちり苗に仕上げましょう！！

●ハウスの温度管理

気象条件に応じたきめ細かな換気でハウス内の適正な温度管理に努めましょう。

温度の目安	
日 中	20～25℃
夜 間	10℃

※田植え1週間前から
活着を良くし初期生育を促進するため、昼夜ともハウスのビニールを開け、苗を十分外気にならしめよう。

●水管理

灌水は早朝にたっぷり行いましょう。

苗箱の乾き具合に応じ、床土が白く乾いたら適宜灌水を行いましょう。

(注) 水稻育苗後にハウス内で野菜を作付けする場合は、苗箱施薬剤は育苗ハウスから搬出した後に施用しましょう！



2 初期の莖数確保は浅植えと浅水管理で！！

田植時のチェック項目

- 坪当たり栽植株数 60～70株
(穂数不足の場合は70株)
- 植付深さ 2～3cm
- 株当たり植付本数 3～4本

田植後の水管理


活着まで (田植後3～4日)
深水管理 (苗が水没しない程度)
↓
活着後
日中3cm程度の浅水管理

③苗取量



①栽植株数

②植付深さ



※田植機に応じて、確認しましょう！

3 除草剤の散布



今年からデビューしました♪
上手に使ってくださいね！

(1) 1回処理体系

除草剤名	剤型	散布時期	処理時のヒエ葉令
シリウスターボ1 和粒剤	粒剤	田植後 7～12日	2.0葉まで
クサトリーDX ジャンボL	パック		

(2) 初期剤+1回処理を組み合わせる体系

マーシット1 和粒剤 (田植後0～5日)	ミスターホームラン1 和粒剤 51 田植後15～25日
	クサトリーDX ジャンボL 田植後15～20日

●除草剤散布後5日間は湛水状態を保ち、7日間は落水しない。

●除草剤の散布は定められた散布量、散布時期、散布方法を守り適期行いましょう。

～各作業が終わったら、生産履歴とGAPチェックシートを記入しましょう～