


稲の生育はやや遅れているものの、分けつ(=茎数)は順調に発生しております。
今後の管理は、早急に「溝切り」し、「**田植え1ヶ月後からの中干し**」を開始しましょう。

《 富山米総点検運動実証ほデータ(射水管内平均) 》

平成23年5月31日調査

年度	てんたかく(3ヶ所)				コシヒカリ(7ヶ所)					
	田植日 (月・日)	草丈 (cm)	㎡当り茎数(本)		葉齢 (枚)	田植日 (月・日)	草丈 (cm)	㎡当り茎数(本)		
			植付時	5/31時				植付時	5/31時	
H23	5/2	23.3	65	162	6.6	5/14	22.1	76	88	4.7
前年	5/4	25.4	84	148	5.8	5/15	22.1	83	83	4.5


1. 田植え1ヶ月後からの「中干し開始」を徹底!



- ほ場が軟らかく中干しが不十分な場合は、溝を手直ししてから再度干しましょう!
- 気象予報を見ながら、好天日を活用し、タイミングを逃さずに!!


半湿田には足が深く沈まない程度

4~5日程度




乾田では弱いヒビが入っている

2~3日程度



亀裂を入れる!



溝がしっかりと残っている!!

2. 中干し後は「間断かん水」で土壌の硬さ向上!!

- 間断かん水: 1~2日湛水 ↔ 3~4日落水
- 出穂まで間断かん水を行い、7月中旬までには足が3cm程度沈む土の硬さとしましょう。

3. 中干し後に目立つ雑草は後期剤で!!

対象雑草	薬剤名	散布量(/10a)	使用時期	注意事項
ノビエ	ヒエクリーン1和粒剤	1kg	移植後15日~ 収穫45日前まで	ノビエ4葉期まで。湛水散布。
多年生広葉雑草等	バサグラン粒剤	3~4kg	移植後15~50日 収穫前60日まで	落水状態で止め水し、散布後3~4日は入水しない。
ノビエ + 多年生広葉雑草等	クリンチャーバスME液剤	1L (70~ 100Lに希釈)	移植後15~ 収穫前50日まで	ノビエ5葉期まで。落水状態で止め水し、散布後3~4日は入水しない。

作業が終わったら、生産履歴とGAPチェックシートを記入しましょう。

【この情報に関するお問合わせは】

J A いみず野 本店第2事務所 営農施設課
高岡農林振興センター 農業普及第二課 射水班

TEL 52-6805
TEL 26-8478