

大麦管理特報 ~第3号~

実需者から望まれる品質の良い麦づくりのため、生育状況を確認し、止葉展開期追肥を確実に行いましょう。

止葉展開期の追肥

あなたの


施肥量
施肥時期の目安

硫安 10 kg/10a
4月14日～16日頃

- ・「施肥が早い」と「倒伏の原因」となります
- ・「遅れたり量が多すぎる」と品質低下の原因となります

茎数の多い圃場や葉色が濃い圃場では施肥量を少なくしてください

水がスムーズに流れるように



溝と確実に連結！
板をはずして掘下げる！
降雨後は水の流れを確認

排水が悪いと登熟が悪くなり、
細麦が増加します

赤かび病防除は必ず2回！！


1回目 (4月末頃)	穂揃い期	トップジンM粉剤DL	4 kg/10a
		トップジンM水和剤	1000倍 150 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a
		トップジンMソル	8倍 0.8 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a (ラジヘリ)
2回目 (5月上旬頃)	1回目の7日後	ワークアップ粉剤DL	3 kg/10a
		チルト乳剤25	1000倍 150 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a 8倍 0.8 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a (ラジヘリ)

防除日の詳細については、次回特報でお知らせします。


大麦管理特報 ~第3号~

実需者から望まれる品質の良い麦づくりのため、肥効調節型肥料を施用された栽培者の止葉展開期追肥について。

止葉展開期の追肥は施用しない



水がスムーズに流れるように



溝と確実に連結！
板をはずして掘下げる！
降雨後は水の流れを確認

排水が悪いと登熟が悪くなり、
細麦が増加します

赤かび病防除は必ず2回！！

1回目 (4月末頃)	穂揃い期	トップジンM粉剤DL	4 kg/10a
		トップジンM水和剤	1000倍 150 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a
		トップジンMゾル	8倍 0.8 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a (ラジヘリ)
2回目 (5月上旬頃)	1回目の7日後	ワークアップ粉剤DL	3 kg/10a
		チルト乳剤25	1000倍 150 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a
			8倍 0.8 $\frac{\text{リットル}}{\text{ヘクタール}}$ /10a (ラジヘリ)

防除日の詳細については、次回特報でお知らせします。