

# シャクヤクに使用できる農薬一覧

【平成28年7月26日現在】

## ○留意事項(必ずお読みください)

- ここに掲載する農薬登録情報は、農林水産消費安全技術センターホームページの「農薬登録情報提供システム」を用いて検索により得られたデータを、当センターで表の順序を入れ換えるなどの改変を行ったものです。  
なお、掲載に関し、データの提供元である農林水産消費安全技術センターから事前に了解を得ています。
- 実際の農薬使用にあたっては個々の農薬の登録内容をラベルで確認の上で使用してください。

## ○「農薬登録情報提供システム」での検索条件等

検索年月日: 平成28年7月26日  
 検索の種類: 作物名検索CSVダウンロード  
 検索方法: 「作物名称」欄に、絞込み操作により「しゃくやく(薬用)」を入力し、「用途」欄の「殺虫剤」「殺菌剤」「除草剤」のうち1つにチェックを入れて「ダウンロード」をクリック(用途別に3種の表をダウンロード)  
 ※絞込みは右記の分類で実施 野菜類 > その他野菜類 > しゃくやく(薬用)  
 ※検索画面の「用途」欄には、上記3種以外に「その他」も選択できるが、検索結果は「該当なし」であった。  
 検索結果の  
 変更事項: ①病害虫名称ごとに掲載するため、表の順序を入れ換え  
 ②下記項目以外を省略

## ○検索結果

### 《殺虫剤》

病害虫名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
根黒斑病	カーバムナトリウム塩液剤	キルパー	原液として 60 L/10a		は種又は定植の15日前まで	1回	所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆または覆土・鎮圧する。

### 《殺菌剤》

雑草名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
うどんこ病	TPN水和剤	STダコニール1000	1000倍	100～ 300 L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布
		クミアイダコニール1000					
		ダコニール1000					
灰色かび病	ベノミル水和剤	GFベンレート水和剤	1000倍	100～ 300 L/10a	収穫14日前まで	8回以内	散布
		ベンレート水和剤					

### 《除草剤》

雑草名称	農薬の種類	農薬の名称	希釈倍率又は使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
一年生雑草	グリホサートカリウム塩液剤	ラウンドアップマックスロード	200～ 500ml/10a	通常散布50～ 100L/10a 少量散布25～ 50L/10a	耕起前まで (雑草生育期)	1回	雑草茎葉 散布
一年生雑草	グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンiQ	250～ 500ml/10a	25～ 100L/10a	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫7日 前まで	3回以内	雑草茎葉 散布
一年生雑草 (ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)	トリフルラリン乳剤	トレファノサイド乳剤 STトレファノサイド乳剤	300ml/10a	100L/10a	萌芽前 雑草発生前	1回	全面土壌 散布
一年生雑草	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	コンパカレール液剤 エイトアップ液剤 グリホエクス液剤 ハーブ・ニート液剤 サンフーロン液剤 ハイーフウノン液剤	250～ 500ml/10a	100L/10a	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	1回	雑草茎葉 散布
一年生雑草	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	ホクサンクサトリキング キャピタルグリホサート41% カルナクス 草枯らしMIC マイター液剤 クサクリア クサクリーン液剤	250～ 500ml/10a	通常散布50～ 100L/10a 少量散布25～ 50L/10a	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期)	1回	雑草茎葉 散布

## ○適用作物表※における分類

※平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知  
 「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用についての別表1(1-1及び1-2)

シャクヤクは、大グループ名「野菜類」、中グループ名「その他野菜類」の分類で、作物名「しゃくやく(薬用)」として掲載されている。  
 作物名が「野菜類」で登録された農薬は、シャクヤクにも使用可能  
 薬用で栽培するシャクヤクは、「花き類・観葉植物」に分類される「しゃくやく」とは登録農薬が異なる。