

## 9. 主要部位別の資料（平成23年）

### （1）受診の動機

（H23年）

部位	国際分類	観察数	自覚症状	検診	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	7,390 (100%)	23.6%	19.8%	56.6%
食道	C15	177 (100%)	22.0	17.5	60.5
胃	C16	1,313 (100%)	20.9	27.0	52.0
結腸	C18	748 (100%)	28.5	21.0	50.5
直腸	C19～C21	335 (100%)	36.4	17.3	46.3
肝臓	C22	249 (100%)	14.9	3.6	81.5
胆嚢・胆管	C23～C24	188 (100%)	31.9	5.3	62.8
膵臓	C25	281 (100%)	28.1	2.5	69.4
肺	C33～C34	792 (100%)	16.8	22.9	60.4
皮膚	C43～C44, C46	110 (100%)	30.0	0.0	70.0
乳房	C50, D05	649 (100%)	34.1	31.7	34.2
子宮	C53～58, D06	286 (100%)	19.2	36.7	44.1
卵巣	C56～C57	75 (100%)	32.0	4.0	64.0
前立腺	C61	442 (100%)	15.6	23.8	60.6
膀胱	C67	172 (100%)	39.5	4.1	56.4
腎臓・尿管	C64～C68	231 (100%)	18.2	13.0	68.8
脳	C71	32 (100%)	25.0	12.5	62.5
甲状腺	C73	143 (100%)	21.7	14.7	63.6
リンパ組織	C81～C90, C96	236 (100%)	18.6	9.3	72.0
白血病	C91～C95	68 (100%)	13.2	7.4	79.4

### （2）病巣の広がり

（H23年）

部位	国際分類	観察数	早期 （上皮内）	当該臓器 限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔 転移	不明
全部位	C00～C96, D00～D09	7,390 (100%)	10.5%	41.2%	9.2%	11.3%	15.3%	12.4%
食道	C15	177 (100%)	2.3	28.8	5.6	14.7	16.9	31.6
胃	C16	1,313 (100%)	3.4	54.8	11.0	6.4	16.1	8.4
結腸	C18	748 (100%)	0.5	46.1	17.4	9.5	20.3	6.1
直腸	C19～C21	335 (100%)	1.8	44.8	20.3	7.5	17.9	7.8
肝臓	C22	249 (100%)	0.0	52.6	3.2	16.5	9.2	18.5
胆嚢・胆管	C23～C24	188 (100%)	0.5	14.9	6.4	38.8	18.1	21.3
膵臓	C25	281 (100%)	0.0	5.3	4.6	24.6	43.1	22.4
肺	C33～C34	792 (100%)	0.0	34.8	10.4	14.0	28.7	12.1
皮膚	C43～C44, C46	110 (100%)	0.0	79.1	3.6	8.2	1.8	7.3
乳房	C50, D05	626 (100%)	12.8	54.8	17.7	3.7	4.0	7.0
子宮	C53～58, D06	286 (100%)	49.3	24.8	2.8	13.6	3.1	6.3
卵巣	C56～C57	75 (100%)	0.0	37.3	0.0	40.0	14.7	8.0
前立腺	C61	442 (100%)	0.0	58.6	1.1	14.3	11.3	14.7
膀胱	C67	172 (100%)	0.0	69.8	1.7	11.6	5.8	11.0
腎臓・尿管	C64～C68	231 (100%)	0.4	55.8	2.6	21.6	13.4	6.1
脳	C71	32 (100%)	0.0	62.5	0.0	12.5	0.0	25.0
甲状腺	C73	143 (100%)	0.0	43.4	37.8	10.5	2.8	5.6

### (3) 診断方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H23年)

部位	国際分類	画像診断	病理診断			その他	
			細胞診	組織診	剖検		
全部位	C00～C96, D00～D09	89.5	81.1	27.6	71.2	0.0	57.4
食道	C15	93.3	89.9	9.0	88.2	0.0	75.3
胃	C16	91.6	95.5	7.3	94.8	0.2	60.0
結腸	C18	89.8	84.4	5.7	82.9	0.0	60.2
直腸	C19～C21	91.1	88.8	5.3	87.9	0.3	56.5
肝臓	C22	95.2	20.7	3.6	18.3	0.0	71.3
胆嚢・胆管	C23～C24	92.6	60.1	31.9	38.3	0.0	68.1
膵臓	C25	95.0	47.7	28.5	27.0	0.0	74.4
肺	C33～C34	94.0	79.6	67.2	62.1	0.0	84.8
乳房(女性)	C50, D05	90.1	90.1	32.7	78.1	0.0	64.3
乳房(男性)	C50, D05	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0
子宮頸部	C53	95.9	95.9	85.1	79.7	0.0	75.7
子宮体部	C54	94.2	94.2	85.5	81.2	0.0	84.1
卵巣	C56～C57	94.7	85.3	73.3	65.3	0.0	82.7
前立腺	C61	86.5	85.1	5.0	84.2	0.0	67.6
膀胱	C67	93.1	90.8	67.6	60.7	0.0	23.7
腎臓・尿管	C64～C66, C68	96.1	65.2	47.6	33.5	0.0	23.2
脳	C71	100.0	33.3	6.1	33.3	0.0	15.2
甲状腺	C73	95.8	90.2	74.1	36.4	0.0	23.1

### (4) 治療方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H23年)

部位	国際分類	手術	放射線	化学療法	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	65.2	12.4	31.9	16.4
食道	C15	46.6	37.6	52.2	13.5
胃	C16	80.1	0.6	22.9	11.3
結腸	C18	91.6	0.5	34.4	6.6
直腸	C19～C21	92.6	3.3	34.9	4.7
肝	C22	24.3	4.4	39.4	44.2
胆嚢・胆管	C23～C24	53.7	7.4	26.1	28.2
膵	C25	30.2	6.4	58.0	28.5
肺	C33～C34	44.0	19.2	41.1	17.7
乳房(女性)	C50, D05	88.7	43.7	37.3	10.7
乳房(男性)	C50, D05	100.0	100.0	100.0	0.0
子宮頸部	C53	55.4	51.4	43.2	9.5
子宮体部	C54	92.8	2.9	49.3	7.2
卵巣	C56～C57	88.0	0.0	68.0	8.0
前立腺	C61	20.9	21.2	16.4	46.4
膀胱	C67	78.6	17.9	27.2	10.4
腎・尿管	C64～C66, C68	70.4	8.6	19.7	20.6
脳	C71	57.6	42.4	42.4	42.4
甲状腺	C73	88.8	5.6	3.5	14.0

### (5) 年齢階級別罹患数

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	口腔								咽頭	
	C00～C96	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総数	4,933	93	0	20	6	8	7	8	13	3
0～4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	30	1	0	0	0	0	0	0	1	0
40～44	65	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45～49	72	2	0	0	1	0	0	0	1	0
50～54	137	2	0	1	0	0	1	0	0	0
55～59	291	8	0	4	1	1	0	1	0	0
60～64	673	22	0	5	2	1	3	0	4	1
65～69	718	13	0	2	0	1	1	0	4	0
70～74	808	13	0	1	1	3	0	1	2	0
75～79	859	16	0	6	1	1	1	2	0	1
80～84	715	9	0	1	0	1	0	3	1	0
85～	531	6	0	0	0	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	口腔								咽頭	
	C00～C96	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総数	3,792	44	0	6	4	13	2	10	3	3
0～4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25～29	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	47	2	0	0	1	0	0	0	0	1
35～39	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	190	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50～54	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	433	6	0	1	0	2	0	1	2	0
65～69	392	4	0	0	1	2	0	1	0	0
70～74	402	5	0	0	0	0	2	2	1	0
75～79	495	5	0	0	0	1	0	3	0	0
80～84	481	6	0	2	0	3	0	0	0	1
85～	688	14	0	1	2	5	0	3	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
総数	23	5	168	977	11	427	258	227	141	193
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0
35~39	0	0	0	2	1	2	5	1	0	0
40~44	0	0	3	7	0	2	1	1	2	3
45~49	0	0	2	9	2	9	6	3	0	2
50~54	0	0	7	26	0	10	13	5	2	5
55~59	1	0	10	58	3	24	19	14	6	8
60~64	5	1	27	145	1	48	31	29	12	24
65~69	4	1	31	146	0	76	39	35	12	27
70~74	5	0	25	184	2	66	53	47	22	39
75~79	3	1	34	160	1	76	46	36	32	29
80~84	3	0	16	131	1	68	28	31	29	38
85~	2	2	12	106	0	45	17	24	24	18
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
総数	2	1	27	492	19	421	139	138	111	183
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30~34	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
35~39	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0
40~44	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0
45~49	0	0	1	9	0	6	7	0	0	3
50~54	0	0	1	14	0	9	8	0	2	2
55~59	0	0	2	21	3	29	9	1	3	5
60~64	0	0	3	52	1	37	17	5	6	15
65~69	0	0	6	52	1	38	17	15	4	13
70~74	0	0	3	63	3	61	7	17	13	13
75~79	1	0	5	81	2	75	26	31	13	31
80~84	0	0	2	85	2	54	28	26	24	38
85~	1	1	4	107	7	106	18	42	46	63
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総数	2	1	9	46	677	14	13	0	5	16
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35～39	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1
40～44	1	1	2	0	8	0	1	0	0	1
45～49	0	0	0	1	8	1	0	0	1	0
50～54	0	0	0	2	9	0	1	0	0	1
55～59	0	0	1	3	31	1	1	0	0	3
60～64	1	0	4	4	81	1	2	0	0	1
65～69	0	0	0	11	92	2	1	0	1	0
70～74	0	0	0	5	107	3	2	0	1	2
75～79	0	0	1	6	128	3	2	0	0	2
80～84	0	0	1	9	118	1	1	0	1	2
85～	0	0	0	5	92	2	2	0	1	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総数	13	2	6	4	292	3	7	0	5	11
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40～44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	5	0	0	0	1	1
50～54	1	0	1	0	11	0	1	0	0	1
55～59	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
60～64	4	0	0	0	41	1	0	0	0	1
65～69	1	0	1	1	37	0	1	0	1	1
70～74	1	1	1	0	26	1	1	0	0	2
75～79	1	0	1	2	40	0	1	0	0	2
80～84	1	0	1	1	57	0	0	0	1	0
85～	3	1	1	0	62	1	3	0	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睪丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
総数	5	50	1	477	16	9
0～4	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	3	0
30～34	0	0	0	0	0	0
35～39	0	1	0	0	5	0
40～44	0	2	0	0	3	0
45～49	0	1	0	1	1	0
50～54	1	2	0	7	0	0
55～59	0	3	1	27	1	0
60～64	1	3	0	64	3	0
65～69	1	8	0	76	0	2
70～74	1	4	0	83	0	1
75～79	1	9	0	97	0	2
80～84	0	9	0	70	0	1
85～	0	8	0	52	0	3
不詳	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)		部位不明					その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
総数	9	54	680	157	6	76	0	75	85	9
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15～19	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0
20～24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
25～29	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0
30～34	0	2	5	4	0	3	0	1	0	0
35～39	0	0	32	8	1	4	0	3	4	0
40～44	1	1	54	16	0	15	0	1	2	0
45～49	1	3	87	21	1	6	0	14	10	0
50～54	1	2	66	11	0	3	0	8	11	0
55～59	0	1	63	11	0	6	0	5	6	0
60～64	1	5	111	21	1	7	0	13	11	0
65～69	1	3	82	16	1	3	0	12	15	0
70～74	0	4	71	15	0	10	0	5	6	1
75～79	0	7	43	14	1	6	0	7	5	0
80～84	0	8	37	9	0	4	0	5	4	4
85～	4	18	28	7	1	5	0	1	6	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器		C69	C71	その他神経系	C73	その他内分泌腺	部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68			C70, C72		C74～C75	C76	C77	C78
総数	141	179	2	29	17	45	11	1	0	6
0～4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5～9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30～34	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
35～39	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0
40～44	2	3	0	1	2	1	2	0	0	0
45～49	0	5	0	0	1	3	1	0	0	0
50～54	1	8	0	1	1	3	1	0	0	0
55～59	8	12	0	1	1	6	0	0	0	0
60～64	18	24	1	4	3	8	0	0	0	1
65～69	15	29	0	1	2	6	0	0	0	1
70～74	24	25	0	5	3	6	1	0	0	0
75～79	25	27	0	3	1	4	1	0	0	1
80～84	22	24	0	5	1	2	2	0	0	1
85～	25	19	0	4	1	2	0	0	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器		C69	C71	その他神経系	C73	その他内分泌腺	部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68			C70, C72		C74～C75	C76	C77	C78
総数	57	87	1	30	34	110	12	1	1	7
0～4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
20～24	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
30～34	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
35～39	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
40～44	0	0	0	1	2	13	2	0	0	0
45～49	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
50～54	0	0	0	1	1	12	2	0	0	0
55～59	0	6	0	1	4	14	1	0	0	0
60～64	6	11	0	4	9	14	0	0	0	0
65～69	2	13	0	3	3	10	0	0	1	0
70～74	7	6	0	8	3	5	2	0	0	0
75～79	10	17	0	4	4	8	1	0	0	1
80～84	11	14	0	2	3	5	0	0	0	2
85～	21	19	0	4	3	11	2	1	0	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	0	27	213	140	12	30	31	81	19	50
0~4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5~9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	2	1	1	0	0	3	1	2
20~24	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
25~29	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
30~34	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
35~39	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
40~44	0	1	3	1	2	0	0	4	0	4
45~49	0	1	3	3	0	0	0	3	3	0
50~54	0	1	8	2	1	4	1	7	2	5
55~59	0	1	16	7	1	4	4	3	0	3
60~64	0	3	31	22	2	5	2	10	2	5
65~69	0	7	23	17	0	3	3	11	4	7
70~74	0	2	24	14	1	3	6	5	1	4
75~79	0	6	38	27	2	4	5	7	0	5
80~84	0	4	33	26	0	4	3	13	3	7
85~	0	1	28	20	0	1	7	11	0	7
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	4	24	169	109	6	18	36	54	9	32
0~4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
25~29	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35~39	0	0	3	2	0	1	0	1	0	1
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0
50~54	0	0	5	2	0	1	2	0	0	0
55~59	1	2	10	8	0	1	1	2	1	1
60~64	0	1	19	16	0	3	0	6	3	2
65~69	0	2	19	11	1	4	3	8	2	4
70~74	0	3	16	7	1	5	3	6	1	3
75~79	1	0	25	16	1	0	8	8	0	8
80~84	0	2	28	17	1	2	8	10	1	7
85~	2	14	38	27	0	0	11	10	0	5
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H23年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
総数	1	2	9	225	7	20	93
0～4	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	1	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	7	0	0	0
45～49	0	0	0	4	0	0	2
50～54	0	0	0	11	0	0	2
55～59	0	0	0	16	1	1	3
60～64	1	1	1	48	1	2	15
65～69	0	0	0	34	1	1	14
70～74	0	0	0	37	0	5	11
75～79	0	1	1	44	0	2	19
80～84	0	0	3	16	3	7	18
85～	0	0	4	7	1	2	9
不詳	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H23年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
総数	1	5	7	107	2	16	142	23
0～4	0	1	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	4	0
25～29	0	0	0	0	0	0	13	0
30～34	0	0	0	0	0	0	27	0
35～39	0	0	0	1	0	0	38	0
40～44	0	0	0	2	0	0	23	0
45～49	0	0	0	4	0	0	20	0
50～54	0	0	0	3	0	0	3	0
55～59	0	0	0	6	1	1	6	1
60～64	0	1	0	15	1	2	4	3
65～69	0	2	0	14	0	2	2	3
70～74	1	0	1	22	0	3	1	5
75～79	0	0	0	20	0	3	1	7
80～84	0	1	1	12	0	2	0	2
85～	0	0	5	8	0	3	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

### (5) 性・年齢階級別罹患率

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96	口腔								咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	72.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0
40～44	173.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
45～49	232.5	6.5	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
50～54	441.7	6.4	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
55～59	824.5	22.7	0.0	11.3	2.8	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0
60～64	1360.2	44.5	0.0	10.1	4.0	2.0	6.1	0.0	8.1	2.0
65～69	2109.0	38.2	0.0	5.9	0.0	2.9	2.9	0.0	11.7	0.0
70～74	2816.2	45.3	0.0	3.5	3.5	10.5	0.0	3.5	7.0	0.0
75～79	3470.3	64.6	0.0	24.2	4.0	4.0	4.0	8.1	0.0	4.0
80～84	3975.8	50.0	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0	16.7	5.6	0.0
85～	4226.7	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
粗罹患率	940.3	17.7	0.0	3.8	1.1	1.5	1.3	1.5	2.5	0.6
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	485.6	9.5	0.0	2.2	0.8	0.8	0.7	0.7	1.5	0.4
世界人口	343.5	6.9	0.0	1.5	0.6	0.6	0.6	0.4	1.2	0.3

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96	口腔								咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	60.6	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	99.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	155.7	6.6	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
35～39	251.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	339.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	611.1	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	530.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	603.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	840.4	11.6	0.0	1.9	0.0	3.9	0.0	1.9	3.9	0.0
65～69	1043.9	10.7	0.0	0.0	2.7	5.3	0.0	2.7	0.0	0.0
70～74	1175.1	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	2.9	0.0
75～79	1430.8	14.5	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	8.7	0.0	0.0
80～84	1662.6	20.7	0.0	6.9	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	3.5
85～	2109.1	42.9	0.0	3.1	6.1	15.3	0.0	9.2	0.0	3.1
粗罹患率	672.6	7.8	0.0	1.1	0.7	2.3	0.4	1.8	0.5	0.5
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	358.4	3.3	0.0	0.8	0.4	0.7	0.2	0.6	0.3	0.3
世界人口	272.3	2.5	0.0	0.7	0.3	0.5	0.1	0.4	0.2	0.2

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
		口腔					肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	3.1	9.3	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	4.8	12.0	2.4	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	8.0	18.7	0.0	5.3	2.7	2.7	5.3	8.0
45~49	0.0	0.0	6.5	29.1	6.5	29.1	19.4	9.7	0.0	6.5
50~54	0.0	0.0	22.6	83.8	0.0	32.2	41.9	16.1	6.4	16.1
55~59	2.8	0.0	28.3	164.3	8.5	68.0	53.8	39.7	17.0	22.7
60~64	10.1	2.0	54.6	293.1	2.0	97.0	62.7	58.6	24.3	48.5
65~69	11.7	2.9	91.1	428.8	0.0	223.2	114.6	102.8	35.2	79.3
70~74	17.4	0.0	87.1	641.3	7.0	230.0	184.7	163.8	76.7	135.9
75~79	12.1	4.0	137.4	646.4	4.0	307.0	185.8	145.4	129.3	117.2
80~84	16.7	0.0	89.0	728.4	5.6	378.1	155.7	172.4	161.3	211.3
85~	15.9	15.9	95.5	843.7	0.0	358.2	135.3	191.0	191.0	143.3
粗罹患率	4.4	1.0	32.0	186.2	2.1	81.4	49.2	43.3	26.9	36.8
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	2.1	0.4	17.2	94.2	1.6	41.4	27.1	22.0	12.2	18.3
世界人口	1.5	0.3	12.3	66.2	1.2	28.8	19.2	15.4	7.9	12.6

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
		口腔					肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	7.6	0.0	2.5	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	3.2	28.9	0.0	19.3	22.5	0.0	0.0	9.6
50~54	0.0	0.0	3.1	43.9	0.0	28.2	25.1	0.0	6.3	6.3
55~59	0.0	0.0	5.5	57.3	8.2	79.2	24.6	2.7	8.2	13.7
60~64	0.0	0.0	5.8	100.9	1.9	71.8	33.0	9.7	11.6	29.1
65~69	0.0	0.0	16.0	138.5	2.7	101.2	45.3	39.9	10.7	34.6
70~74	0.0	0.0	8.8	184.2	8.8	178.3	20.5	49.7	38.0	38.0
75~79	2.9	0.0	14.5	234.1	5.8	216.8	75.2	89.6	37.6	89.6
80~84	0.0	0.0	6.9	293.8	6.9	186.7	96.8	89.9	83.0	131.4
85~	3.1	3.1	12.3	328.0	21.5	324.9	55.2	128.8	141.0	193.1
粗罹患率	0.4	0.2	4.8	87.3	3.4	74.7	24.7	24.5	19.7	32.5
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.1	0.0	2.3	35.3	1.2	29.8	11.9	7.4	5.5	10.2
世界人口	0.0	0.0	1.7	25.1	0.9	21.0	8.8	4.8	3.7	6.9

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
40～44	2.7	2.7	5.3	0.0	21.3	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7
45～49	0.0	0.0	0.0	3.2	25.8	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	6.4	29.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2
55～59	0.0	0.0	2.8	8.5	87.8	2.8	2.8	0.0	0.0	8.5
60～64	2.0	0.0	8.1	8.1	163.7	2.0	4.0	0.0	0.0	2.0
65～69	0.0	0.0	0.0	32.3	270.2	5.9	2.9	0.0	2.9	0.0
70～74	0.0	0.0	0.0	17.4	372.9	10.5	7.0	0.0	3.5	7.0
75～79	0.0	0.0	4.0	24.2	517.1	12.1	8.1	0.0	0.0	8.1
80～84	0.0	0.0	5.6	50.0	656.1	5.6	5.6	0.0	5.6	11.1
85～	0.0	0.0	0.0	39.8	732.3	15.9	15.9	0.0	8.0	15.9
粗罹患率	0.4	0.2	1.7	8.8	129.0	2.7	2.5	0.0	1.0	3.0
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.3	0.2	1.1	4.5	62.1	1.4	1.4	0.0	0.6	2.0
世界人口	0.2	0.2	0.8	3.2	42.5	1.0	1.0	0.0	0.4	1.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
40～44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	3.2	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
50～54	3.1	0.0	3.1	0.0	34.5	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1
55～59	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	7.8	0.0	0.0	0.0	79.6	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9
65～69	2.7	0.0	2.7	2.7	98.5	0.0	2.7	0.0	2.7	2.7
70～74	2.9	2.9	2.9	0.0	76.0	2.9	2.9	0.0	0.0	5.8
75～79	2.9	0.0	2.9	5.8	115.6	0.0	2.9	0.0	0.0	5.8
80～84	3.5	0.0	3.5	3.5	197.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
85～	9.2	3.1	3.1	0.0	190.1	3.1	9.2	0.0	0.0	3.1
粗罹患率	2.3	0.4	1.1	0.7	51.8	0.5	1.2	0.0	0.9	2.0
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	1.1	0.1	0.5	0.3	20.9	0.2	0.5	0.0	0.9	1.4
世界人口	0.9	0.1	0.4	0.2	15.1	0.2	0.4	0.0	0.9	1.3

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睪丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	2.4	0.0	0.0	12.0	0.0
40～44	0.0	5.3	0.0	0.0	8.0	0.0
45～49	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0
50～54	3.2	6.4	0.0	22.6	0.0	0.0
55～59	0.0	8.5	2.8	76.5	2.8	0.0
60～64	2.0	6.1	0.0	129.4	6.1	0.0
65～69	2.9	23.5	0.0	223.2	0.0	5.9
70～74	3.5	13.9	0.0	289.3	0.0	3.5
75～79	4.0	36.4	0.0	391.9	0.0	8.1
80～84	0.0	50.0	0.0	389.2	0.0	5.6
85～	0.0	63.7	0.0	413.9	0.0	23.9
粗罹患率	1.0	9.5	0.2	90.9	3.0	1.7
年齢調整罹患率						
S60年モデル人口	0.6	5.0	0.2	43.7	3.0	0.7
世界人口	0.4	3.5	0.1	30.0	2.6	0.5

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)		部位不明					その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	12.3	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	4.0	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	4.0	0.0
30～34	0.0	6.6	16.6	13.3	0.0	9.9	0.0	3.3	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	81.4	20.3	2.5	10.2	0.0	7.6	10.2	0.0
40～44	2.7	2.7	147.8	43.8	0.0	41.0	0.0	2.7	5.5	0.0
45～49	3.2	9.6	279.8	67.5	3.2	19.3	0.0	45.0	32.2	0.0
50～54	3.1	6.3	207.1	34.5	0.0	9.4	0.0	25.1	34.5	0.0
55～59	0.0	2.7	172.0	30.0	0.0	16.4	0.0	13.7	16.4	0.0
60～64	1.9	9.7	215.4	40.8	1.9	13.6	0.0	25.2	21.3	0.0
65～69	2.7	8.0	218.4	42.6	2.7	8.0	0.0	32.0	39.9	0.0
70～74	0.0	11.7	207.5	43.8	0.0	29.2	0.0	14.6	17.5	2.9
75～79	0.0	20.2	124.3	40.5	2.9	17.3	0.0	20.2	14.5	0.0
80～84	0.0	27.7	127.9	31.1	0.0	13.8	0.0	17.3	13.8	13.8
85～	12.3	55.2	85.8	21.5	3.1	15.3	0.0	3.1	18.4	12.3
粗罹患率	1.6	9.6	120.6	27.8	1.1	13.5	0.0	13.3	15.1	1.6
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.9	4.1	90.7	22.0	0.7	11.3	0.0	10.0	11.6	0.3
世界人口	0.7	3.0	70.7	17.5	0.5	9.0	0.0	7.9	9.7	0.2

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
			付属器		その他神経系		その他内分泌腺	部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.1	3.1	0.0	0.0
35～39	0.0	7.2	0.0	4.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	5.3	8.0	0.0	2.7	5.3	2.7	5.3	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	16.1	0.0	0.0	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0
50～54	3.2	25.8	0.0	3.2	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0
55～59	22.7	34.0	0.0	2.8	2.8	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	36.4	48.5	2.0	8.1	6.1	16.2	0.0	0.0	0.0	2.0
65～69	44.1	85.2	0.0	2.9	5.9	17.6	0.0	0.0	0.0	2.9
70～74	83.6	87.1	0.0	17.4	10.5	20.9	3.5	0.0	0.0	0.0
75～79	101.0	109.1	0.0	12.1	4.0	16.2	4.0	0.0	0.0	4.0
80～84	122.3	133.5	0.0	27.8	5.6	11.1	11.1	0.0	0.0	5.6
85～	199.0	151.2	0.0	31.8	8.0	15.9	0.0	0.0	0.0	15.9
粗罹患率	26.9	34.1	0.4	5.5	3.2	8.6	2.1	0.2	0.0	1.1
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	12.6	18.5	0.4	3.3	2.2	6.1	2.0	0.2	0.0	0.5
世界人口	8.6	13.3	0.6	2.7	1.7	4.8	1.9	0.2	0.0	0.3

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
			付属器		その他神経系		その他内分泌腺	部位不明確	続発性	続発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	35.6	5.5	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.6	3.2	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	37.6	6.3	0.0	0.0	0.0
55～59	0.0	16.4	0.0	2.7	10.9	38.2	2.7	0.0	0.0	0.0
60～64	11.6	21.3	0.0	7.8	17.5	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
65～69	5.3	34.6	0.0	8.0	8.0	26.6	0.0	0.0	2.7	0.0
70～74	20.5	17.5	0.0	23.4	8.8	14.6	5.8	0.0	0.0	0.0
75～79	28.9	49.1	0.0	11.6	11.6	23.1	2.9	0.0	0.0	2.9
80～84	38.0	48.4	0.0	6.9	10.4	17.3	0.0	0.0	0.0	6.9
85～	64.4	58.2	0.0	12.3	9.2	33.7	6.1	3.1	0.0	12.3
粗罹患率	10.1	15.4	0.2	5.3	6.0	19.5	2.1	0.2	0.2	1.2
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	2.8	6.0	0.3	2.7	3.4	15.7	1.8	0.0	0.1	0.2
世界人口	1.8	4.3	0.6	2.0	2.6	13.1	1.6	0.0	0.1	0.1

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
5~9	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	7.9	3.9	3.9	0.0	0.0	11.8	3.9	7.9
20~24	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0
30~34	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	2.4
40~44	0.0	2.7	8.0	2.7	5.3	0.0	0.0	10.7	0.0	10.7
45~49	0.0	3.2	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7	0.0
50~54	0.0	3.2	25.8	6.4	3.2	12.9	3.2	22.6	6.4	16.1
55~59	0.0	2.8	45.3	19.8	2.8	11.3	11.3	8.5	0.0	8.5
60~64	0.0	6.1	62.7	44.5	4.0	10.1	4.0	20.2	4.0	10.1
65~69	0.0	20.6	67.6	49.9	0.0	8.8	8.8	32.3	11.7	20.6
70~74	0.0	7.0	83.6	48.8	3.5	10.5	20.9	17.4	3.5	13.9
75~79	0.0	24.2	153.5	109.1	8.1	16.2	20.2	28.3	0.0	20.2
80~84	0.0	22.2	183.5	144.6	0.0	22.2	16.7	72.3	16.7	38.9
85~	0.0	8.0	222.9	159.2	0.0	8.0	55.7	87.6	0.0	55.7
粗罹患率	0.0	5.1	40.6	26.7	2.3	5.7	5.9	15.4	3.6	9.5
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.0	2.9	21.7	13.0	2.1	3.7	2.9	9.9	3.1	5.9
世界人口	0.0	2.0	15.9	9.1	1.9	2.9	2.0	8.1	2.9	4.6

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	5.0	5.0
25~29	0.0	0.0	7.9	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	7.6	5.1	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5
40~44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	12.9	9.6	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
50~54	0.0	0.0	15.7	6.3	0.0	3.1	6.3	0.0	0.0	0.0
55~59	2.7	5.5	27.3	21.8	0.0	2.7	2.7	5.5	2.7	2.7
60~64	0.0	1.9	36.9	31.1	0.0	5.8	0.0	11.6	5.8	3.9
65~69	0.0	5.3	50.6	29.3	2.7	10.7	8.0	21.3	5.3	10.7
70~74	0.0	8.8	46.8	20.5	2.9	14.6	8.8	17.5	2.9	8.8
75~79	2.9	0.0	72.3	46.2	2.9	0.0	23.1	23.1	0.0	23.1
80~84	0.0	6.9	96.8	58.8	3.5	6.9	27.7	34.6	3.5	24.2
85~	6.1	42.9	116.5	82.8	0.0	0.0	33.7	30.7	0.0	15.3
粗罹患率	0.7	4.3	30.0	19.3	1.1	3.2	6.4	9.6	1.6	5.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.2	1.2	12.9	8.0	0.9	1.9	2.1	4.5	1.1	2.4
世界人口	0.2	0.9	9.5	5.8	0.8	1.5	1.4	3.8	1.0	1.7

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H23年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	6.5
50～54	0.0	0.0	0.0	35.5	0.0	0.0	6.4
55～59	0.0	0.0	0.0	45.3	2.8	2.8	8.5
60～64	2.0	2.0	2.0	97.0	2.0	4.0	30.3
65～69	0.0	0.0	0.0	99.9	2.9	2.9	41.1
70～74	0.0	0.0	0.0	129.0	0.0	17.4	38.3
75～79	0.0	4.0	4.0	177.8	0.0	8.1	76.8
80～84	0.0	0.0	16.7	89.0	16.7	38.9	100.1
85～	0.0	0.0	31.8	55.7	8.0	15.9	71.6
粗罹患率	0.2	0.4	1.7	42.9	1.3	3.8	17.7
年齢調整罹患率							
S60年モデル人口	0.1	0.2	0.6	24.3	0.6	1.7	8.6
世界人口	0.1	0.1	0.4	17.6	0.4	1.1	5.9

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H23年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
0～4	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.6	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	96.7	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	62.9	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	64.3	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	9.4	0.0
55～59	0.0	0.0	0.0	16.4	2.7	2.7	16.4	2.7
60～64	0.0	1.9	0.0	29.1	1.9	3.9	7.8	5.8
65～69	0.0	5.3	0.0	37.3	0.0	5.3	5.3	8.0
70～74	2.9	0.0	2.9	64.3	0.0	8.8	2.9	14.6
75～79	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	8.7	2.9	20.2
80～84	0.0	3.5	3.5	41.5	0.0	6.9	0.0	6.9
85～	0.0	0.0	15.3	24.5	0.0	9.2	0.0	6.1
粗罹患率	0.2	0.9	1.2	19.0	0.4	2.8	25.2	4.1
年齢調整罹患率								
S60年モデル人口	0.1	0.7	0.2	9.5	0.2	1.1	31.3	1.7
世界人口	0.1	0.8	0.2	6.9	0.2	0.8	26.2	1.1



10. 市町村別資料（平成23年）

（1）市町村別登録状況

表 市町村別登録状況（平成23年）

市町村	罹患数	死亡数	I/M比	DCO	DCO%
総計	9,126	3,408	2.68	1,363	14.9
新川医療圏	1,055	421	2.51	114	10.8
黒部	312	135	2.31	27	8.7
入善	230	86	2.67	26	11.3
朝日	126	62	2.03	24	19.0
魚津	387	138	2.80	37	9.6
富山医療圏	3,882	1,488	2.61	545	14.0
滑川	248	119	2.08	55	22.2
舟橋	17	5	3.40	2	11.8
上市	168	68	2.47	21	12.5
立山	191	79	2.42	25	13.1
富山	3,258	1,217	2.68	442	13.6
高岡医療圏	3,024	1,089	2.78	465	15.4
射水	764	276	2.77	106	13.9
高岡	1,824	633	2.88	300	16.4
氷見	436	180	2.42	59	13.5
砺波医療圏	1,165	410	2.84	239	20.5
砺波	405	114	3.55	78	19.3
南砺	501	175	2.86	113	22.6
小矢部	259	121	2.14	48	18.5

注)

I：がん罹患数

M：がんによる死亡数

I/M比：がん罹患数とがん死亡数との比

DCO：死亡情報のみで登録されたがん患者数

DCO%：がん死亡情報で初めて把握されたがん患者の割合

## (2) 市町村別罹患数

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	5,177	97	0	22	7	8	7	8	14	3
新川医療圏	602	15	0	2	2	2	0	2	4	0
黒部	174	1	0	0	0	0	0	1	0	0
入善	134	5	0	0	1	1	0	0	1	0
朝日	67	2	0	0	0	1	0	0	1	0
魚津	227	7	0	2	1	0	0	1	2	0
富山医療圏	2,161	44	0	10	3	2	3	3	7	3
滑川	121	5	0	1	0	0	2	0	1	1
舟橋	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立山	104	2	0	2	0	0	0	0	0	0
富山	1,839	37	0	7	3	2	1	3	6	2
高岡医療圏	1,767	28	0	9	2	2	2	1	3	0
射水	439	6	0	3	0	1	0	1	0	0
高岡	1,075	19	0	5	2	1	2	0	3	0
氷見	253	3	0	1	0	0	0	0	0	0
砺波医療圏	647	10	0	1	0	2	2	2	0	0
砺波	226	7	0	1	0	2	1	2	0	0
南砺	272	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小矢部	149	2	0	0	0	0	1	0	0	0

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	3,949	44	0	6	4	13	2	10	3	3
新川医療圏	453	2	0	0	0	1	0	1	0	0
黒部	138	1	0	0	0	0	0	1	0	0
入善	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朝日	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚津	160	1	0	0	0	1	0	0	0	0
富山医療圏	1,721	17	0	3	0	6	2	3	2	1
滑川	127	1	0	0	0	1	0	0	0	0
舟橋	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立山	87	3	0	0	0	0	1	1	1	0
富山	1,419	13	0	3	0	5	1	2	1	1
高岡医療圏	1,257	20	0	1	4	5	0	6	1	2
射水	325	7	0	0	1	1	0	5	0	0
高岡	749	9	0	0	2	4	0	1	1	0
氷見	183	4	0	1	1	0	0	0	0	2
砺波医療圏	518	5	0	2	0	1	0	0	0	0
砺波	179	1	0	0	0	1	0	0	0	0
南砺	229	4	0	2	0	0	0	0	0	0
小矢部	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総計	23	5	181	1,017	12	443	263	238	153	217
新川医療圏	3	0	26	114	1	40	28	32	16	33
黒部	0	0	11	39	0	13	9	12	3	9
入善	2	0	3	18	0	5	6	4	3	9
朝日	0	0	4	10	0	2	2	5	2	4
魚津	1	0	8	47	1	20	11	11	8	11
富山医療圏	9	4	71	441	4	207	109	89	47	85
滑川	0	0	2	30	0	20	8	8	0	2
舟橋	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
上市	0	0	1	21	0	6	4	5	1	8
立山	0	0	7	21	1	13	8	5	1	2
富山	9	4	61	367	3	167	88	71	45	73
高岡医療圏	8	1	66	324	7	149	95	92	65	71
射水	1	0	18	88	1	35	25	21	18	16
高岡	5	1	40	188	5	93	58	60	35	46
氷見	2	0	8	48	1	21	12	11	12	9
砺波医療圏	3	0	18	138	0	47	31	25	25	28
砺波	1	0	8	44	0	14	10	7	6	9
南砺	1	0	9	57	0	24	15	9	12	13
小矢部	1	0	1	37	0	9	6	9	7	6

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総計	2	1	29	516	21	433	141	142	116	202
新川医療圏	0	0	3	70	0	41	22	17	12	23
黒部	0	0	1	23	0	12	8	7	4	5
入善	0	0	0	12	0	9	6	3	3	6
朝日	0	0	0	10	0	7	2	1	2	3
魚津	0	0	2	25	0	13	6	6	3	9
富山医療圏	0	0	14	230	10	205	66	52	51	77
滑川	0	0	0	25	1	17	2	11	4	5
舟橋	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
上市	0	0	0	14	0	11	3	2	0	4
立山	0	0	0	10	1	14	1	3	2	3
富山	0	0	14	180	8	163	60	36	45	63
高岡医療圏	1	0	6	147	7	129	43	55	37	66
射水	0	0	1	39	2	27	7	19	13	18
高岡	1	0	4	81	5	83	31	26	18	38
氷見	0	0	1	27	0	19	5	10	6	10
砺波医療圏	1	1	6	69	4	58	10	18	16	36
砺波	0	0	0	20	2	21	1	7	7	11
南砺	1	1	4	35	2	23	6	8	6	17
小矢部	0	0	2	14	0	14	3	3	3	8

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	後腹膜・		部位不明		鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織		
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49		
総計	2	1	9	46	743	16	16	0	5	17		
新川医療圏	0	1	1	6	91	2	1	0	1	6		
黒部	0	0	0	0	25	0	0	0	0	2		
入善	0	1	0	1	23	2	0	0	1	2		
朝日	0	0	0	0	15	0	0	0	0	1		
魚津	0	0	1	5	28	0	1	0	0	1		
富山医療圏	2	0	6	15	278	8	3	0	1	7		
滑川	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0		
舟橋	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
上市	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1		
立山	0	0	1	1	10	1	0	0	1	0		
富山	2	0	5	13	245	7	3	0	0	6		
高岡医療圏	0	0	2	20	286	2	10	0	1	2		
射水	0	0	1	7	64	1	2	0	0	1		
高岡	0	0	1	10	184	1	8	0	1	0		
氷見	0	0	0	3	38	0	0	0	0	1		
砺波医療圏	0	0	0	5	88	4	2	0	2	2		
砺波	0	0	0	2	23	2	0	0	1	0		
南砺	0	0	0	0	44	2	2	0	1	2		
小矢部	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0		

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	後腹膜・		部位不明		鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織		
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49		
総計	15	2	6	4	312	3	7	0	5	11		
新川医療圏	2	0	0	0	54	0	0	0	1	2		
黒部	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0		
入善	1	0	0	0	8	0	0	0	0	1		
朝日	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0		
魚津	1	0	0	0	20	0	0	0	1	1		
富山医療圏	2	1	1	2	99	1	5	0	2	6		
滑川	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1		
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
上市	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		
立山	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0		
富山	2	1	1	2	79	1	5	0	1	5		
高岡医療圏	9	1	3	2	110	2	2	0	1	3		
射水	3	1	1	1	35	2	1	0	0	1		
高岡	5	0	1	0	63	0	1	0	1	2		
氷見	1	0	1	1	12	0	0	0	0	0		
砺波医療圏	2	0	2	0	49	0	0	0	1	0		
砺波	0	0	0	0	17	0	0	0	1	0		
南砺	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0		
小矢部	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0		

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
総計	5	50	1	491	17	9
新川医療圏	0	5	0	60	3	0
黒部	0	1	0	13	3	0
入善	0	1	0	19	0	0
朝日	0	1	0	7	0	0
魚津	0	2	0	21	0	0
富山医療圏	3	23	0	212	5	3
滑川	0	0	0	9	0	1
舟橋	0	0	0	3	0	0
上市	0	0	0	9	0	0
立山	0	1	0	11	0	0
富山	3	22	0	180	5	2
高岡医療圏	1	19	1	159	8	4
射水	0	2	1	32	2	1
高岡	1	12	0	95	6	2
氷見	0	5	0	32	0	1
砺波医療圏	1	3	0	60	1	2
砺波	1	1	0	28	0	1
南砺	0	1	0	14	0	0
小矢部	0	1	0	18	1	1

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)	C53～55, C58	部位不明				その他女性性器	
	C43	C44, C46	C50, D05		C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
総計	10	57	690	168	6	82	0	80	94	9
新川医療圏	2	8	64	20	0	11	0	9	13	1
黒部	1	3	16	9	0	6	0	3	2	0
入善	0	0	19	5	0	2	0	3	3	0
朝日	1	0	6	2	0	2	0	0	4	1
魚津	0	5	23	4	0	1	0	3	4	0
富山医療圏	2	23	343	78	3	34	0	41	34	7
滑川	1	2	11	9	1	5	0	3	3	0
舟橋	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
上市	1	4	17	5	0	1	0	4	0	1
立山	0	2	13	5	0	4	0	1	0	1
富山	0	15	300	59	2	24	0	33	30	5
高岡医療圏	4	19	211	54	2	31	0	21	30	0
射水	2	2	60	16	1	11	0	4	9	0
高岡	1	15	117	30	0	17	0	13	20	0
氷見	1	2	34	8	1	3	0	4	1	0
砺波医療圏	2	7	72	16	1	6	0	9	17	1
砺波	2	0	26	5	0	3	0	2	7	0
南砺	0	6	26	7	0	0	0	7	8	0
小矢部	0	1	20	4	1	3	0	0	2	1

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64～C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
総計	143	189	2	31	17	45	11	1	0	6
新川医療圏	27	18	0	2	1	4	0	0	0	2
黒部	9	4	0	0	0	3	0	0	0	0
入善	7	5	0	0	0	1	0	0	0	1
朝日	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
魚津	8	8	0	1	1	0	0	0	0	1
富山医療圏	59	88	1	15	10	21	8	1	0	3
滑川	3	4	0	0	0	3	0	0	0	0
舟橋	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	1	5	0	0	2	2	0	0	0	0
立山	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0
富山	50	77	1	13	8	16	8	1	0	3
高岡医療圏	43	58	1	13	5	14	2	0	0	1
射水	11	19	1	2	2	6	1	0	0	0
高岡	27	37	0	11	3	6	1	0	0	0
氷見	5	2	0	0	0	2	0	0	0	1
砺波医療圏	14	25	0	1	1	6	1	0	0	0
砺波	2	12	0	0	0	1	0	0	0	0
南砺	8	7	0	1	1	4	1	0	0	0
小矢部	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64～C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
総計	61	94	1	30	34	110	12	1	1	7
新川医療圏	8	12	0	2	1	12	2	0	1	1
黒部	0	4	0	0	0	7	1	0	0	0
入善	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
朝日	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0
魚津	6	2	0	1	1	4	0	0	1	1
富山医療圏	26	39	1	11	15	57	7	0	0	6
滑川	0	3	0	1	1	1	0	0	0	1
舟橋	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
立山	0	1	0	1	2	4	2	0	0	0
富山	24	35	1	9	12	49	5	0	0	5
高岡医療圏	20	25	0	13	17	32	3	1	0	0
射水	2	7	0	4	1	6	0	0	0	0
高岡	13	16	0	5	14	22	3	1	0	0
氷見	5	2	0	4	2	4	0	0	0	0
砺波医療圏	7	18	0	4	1	9	0	0	0	0
砺波	4	8	0	0	0	5	0	0	0	0
南砺	3	10	0	4	0	3	0	0	0	0
小矢部	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	0	27	220	145	12	31	32	89	19	56
新川医療圏	0	3	26	19	4	2	1	8	3	3
黒部	0	2	7	5	1	0	1	2	1	1
入善	0	1	3	2	1	0	0	3	1	1
朝日	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0
魚津	0	0	13	10	1	2	0	2	1	1
富山医療圏	0	15	85	53	5	14	13	29	6	21
滑川	0	1	6	3	0	2	1	1	0	1
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	4	4	0	0	0	1	0	1
立山	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0
富山	0	14	71	44	5	12	10	27	6	19
高岡医療圏	0	9	77	48	3	12	14	37	7	23
射水	0	5	25	13	2	4	6	10	2	6
高岡	0	3	43	28	1	7	7	23	3	15
氷見	0	1	9	7	0	1	1	4	2	2
砺波医療圏	0	0	32	25	0	3	4	15	3	9
砺波	0	0	12	10	0	0	2	6	0	4
南砺	0	0	14	11	0	2	1	7	2	4
小矢部	0	0	6	4	0	1	1	2	1	1

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	4	27	180	115	6	19	40	60	9	38
新川医療圏	0	3	29	20	1	1	7	3	1	2
黒部	0	2	7	6	0	0	1	0	0	0
入善	0	0	4	2	0	0	2	1	1	0
朝日	0	0	4	3	0	0	1	1	0	1
魚津	0	1	14	9	1	1	3	1	0	1
富山医療圏	0	9	61	38	1	10	12	23	3	16
滑川	0	0	7	4	0	0	3	2	0	2
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0
立山	0	0	4	2	0	1	1	3	1	2
富山	0	8	48	31	1	9	7	18	2	12
高岡医療圏	3	9	60	36	1	8	15	25	4	14
射水	0	4	12	7	0	2	3	5	0	3
高岡	3	4	40	25	1	3	11	16	3	9
氷見	0	1	8	4	0	3	1	4	1	2
砺波医療圏	1	6	30	21	3	0	6	9	1	6
砺波	1	3	7	5	2	0	0	6	0	5
南砺	0	3	17	12	1	0	4	0	0	0
小矢部	0	0	6	4	0	0	2	3	1	1

表 市町村別罹患数・男（H23年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病 C93	白血病 C94	白血病 C95	上皮内癌 D00～D01	上皮内癌 D02	上皮内癌 D03～D04	上皮内癌 D07, 09
総計	2	2	10	225	7	20	95
新川医療圏	0	0	2	11	1	4	13
黒部	0	0	0	3	0	1	2
入善	0	0	1	3	0	1	6
朝日	0	0	1	1	0	0	2
魚津	0	0	0	4	1	2	3
富山医療圏	0	2	0	120	5	6	32
滑川	0	0	0	4	0	0	1
舟橋	0	0	0	0	0	0	1
上市	0	0	0	4	0	1	1
立山	0	0	0	5	1	0	0
富山	0	2	0	107	4	5	29
高岡医療圏	2	0	5	62	1	7	25
射水	0	0	2	12	0	0	3
高岡	2	0	3	37	1	4	14
氷見	0	0	0	13	0	3	8
砺波医療圏	0	0	3	32	0	3	25
砺波	0	0	2	18	0	2	9
南砺	0	0	1	9	0	1	13
小矢部	0	0	0	5	0	0	3

表 市町村別罹患数・女（H23年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病 C93	白血病 C94	白血病 C95	上皮内癌 D00～D01	上皮内癌 D02	上皮内癌 D03～D04	上皮内癌 D06	上皮内癌 D07, 09
総計	1	5	7	107	2	16	142	23
新川医療圏	0	0	0	10	0	5	5	2
黒部	0	0	0	4	0	2	0	0
入善	0	0	0	6	0	1	2	0
朝日	0	0	0	0	0	0	1	2
魚津	0	0	0	0	0	2	2	0
富山医療圏	0	3	1	57	2	5	69	5
滑川	0	0	0	6	0	0	3	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	4	0	0	3	0
立山	0	0	0	4	0	1	0	0
富山	0	3	1	43	2	4	63	5
高岡医療圏	1	2	4	24	0	5	47	12
射水	1	0	1	3	0	1	11	2
高岡	0	2	2	18	0	3	32	8
氷見	0	0	1	3	0	1	4	2
砺波医療圏	0	0	2	16	0	1	21	4
砺波	0	0	1	6	0	0	10	1
南砺	0	0	0	9	0	0	4	2
小矢部	0	0	1	1	0	1	7	1