

日本脳炎流行予測調査における感受性調査(令和元年度)

嶋田 嵩久 長谷川澄代 佐賀由美子 板持 雅恵
稲崎 倫子 小淵 正次 井川 朋子¹ 岩淵 有紀²
高森 徹³ 関 理恵子⁴ 石川 智子⁵ 三井千恵子⁶
大石 和徳

Serological Investigation of Japanese Encephalitis in Toyama Prefecture in the Fiscal Year 2019

Takahisa SHIMADA, Sumiyo HASEGAWA, Yumiko SAGA, Masae ITAMOCHI,
Noriko INASAKI, Masatsugu OBUCHI, Tomoko IKAWA¹, Yuki IWABUCHI²,
Toru TAKAMORI³, Rieko SEKI⁴, Tomoko ISHIKAWA⁵,
Chieko MITSU⁶, and Kazunori OISHI

目的：本調査は、富山県住民の日本脳炎ウイルスに対する中和抗体保有状況を調べ、今後の流行の可能性を推定し、感染予防に役立てることを目的として実施した。

調査および検査方法：令和元年7月から9月に、新川、中部、高岡、砺波の各厚生センターおよび富山市保健所管内で、合計242名について採血と予防接種歴、罹患歴の調査を行った。

日本脳炎ウイルスに対する中和抗体価の測定は、peroxidase-anti-peroxidase (PAP) 法を応用したフォーカス計数法にて行った。血清を56℃、30分間非働化した後、10倍から2倍階段希釈し、100 focus forming units (FFU)/25 μ L に調整したウイルス液（日本脳炎 Beijing-1 株）と等量で混合した。37℃、1時間の中和反応の後、Vero Osaka 細胞に接種した。37℃で1時間ウイルスを吸着させた後、培養液を追加し、37℃で46時間培養した。細胞を洗浄・固定後、抗日本脳炎ウイルスウサギ血清を用いたPAP法によってウイルスフォーカスを染色した。被検血清を加えていないコントロールに比較して、フォーカス数が50%以上減少した最大希釈倍数を中和抗体価とした。抗体価10倍以上を抗体陽性とした。

結果および考察：242名のうち、日本脳炎ウイルスに対する抗体陽性者は158名（65.3%）であった。図1に年齢群別の抗体保有率を示した。年齢

群別に見ると、5～39歳では92.0%以上と高い抗体保有率を示した。これに対し、0～4歳では15.4%、40～49歳では28.0%、50～59歳では19.0%、60歳以上では44.4%と低い保有率を示す年齢群が存在した。この0～4歳の年齢群と40歳以上の年齢群で抗体保有率が低くなる傾向は近年の富山県の結果[1-5]（図2）や全国の結果[6]とほぼ同様であった。

0～4歳の乳幼児における抗体保有率が低いのは、0～4歳の年齢群においてワクチン未接種者の割合が多いことが原因としてあげられる。日本脳炎ワクチンの標準的な接種年齢は3歳で2回（第1期）、4歳で1回（第1期追加）、9歳で1回追加（第2期）の計4回である[7]。図3に年齢群別のワクチン接種歴を、表1に年齢群別およびワクチン接種歴別の抗体保有率を示す。今回調査の0～4歳の年齢群におけるワクチン未接種者の割合は79.5%（31/39）であった（図3、表1）。また、0～4歳の年齢群で、ワクチン接種歴あり中の抗体陽性者の割合は75%（3/4）であり、ワクチン接種歴なし中の抗体陽性者の割合は9.7%（3/31）であった（表1）。このことから、0～4歳の年齢群においてはワクチン未接種者がこの年齢群の抗体保有率を引き下げているといえる。

40歳以上の年齢群で抗体保有率が低い理由は、加齢に伴いワクチン効果が減弱したためと考えられる。60歳以上の年齢群で40～59歳の年代群より抗体保有率がやや増加するのは、60歳以上の年

1. 新川厚生センター、2. 中部厚生センター、3. 高岡厚生センター、4. 砺波厚生センター、
5. 富山市保健所、6. 富山県厚生部健康課

年齢群では日本脳炎ウイルスに自然感染する機会が多かったためと考えられる。

年齢群別およびワクチン接種歴別の抗体保有率を見ると、「接種歴なし」の中に、抗体陽性者が9名(21.4%)存在した。これら抗体陽性者9名に関しては日本脳炎ウイルスに自然感染した可能性が考えられた。なお、この9名うち0歳8ヶ月齢の1名に関しては、母親からの移行抗体が残存したために抗体陽性となった可能性も考えられた。この9名の日本脳炎の罹患歴は7名が「なし」、2

名が「不明」であった。日本脳炎の罹患歴が「なし」であった7名については不顕性感染であったと推定された。

全国においては、日本脳炎ワクチン未接種の小児や高齢者からの患者発生が報告されている[6,7]。県内においても0～4歳の小児や高齢者における抗体保有率が低いことが示された。したがって、これらの集団は日本脳炎ウイルスに感染するリスクが高いため、注意喚起が必要である。

まとめ：今回の調査では、県民の抗体保有率は65.3%であった。また、例年と同様、乳幼児および高齢者の抗体保有率が低いことが確認された。また、不顕性な自然感染をしている人がいることも推定された。富山県では平成9年度を最後に日本脳炎患者は発生していないものの[8]、豚の抗体保有調査やウイルス分離調査において、近年においても県内に日本脳炎ウイルスが存在していることが確認されている[8-12]。

したがって、日本脳炎ウイルスに感染するリスクの高い抗体保有率の低い年代に対して、注意喚起が必要である。

謝 辞

本調査の実施にあたり、検体採取等にご協力いただいた関係各位に深謝いたします。

文 献

1. 稲崎倫子, 嶋 一世, 小淵正次, 他. (2015). 富山衛研年報, 38, 76-79
2. 名古屋真弓, 稲崎倫子, 小淵正次, 他. (2016). 富山衛研年報, 39, 76-79
3. 稲崎倫子, 青柳由美子, 米田哲也, 他. (2017). 富山衛研年報, 40, 75-77
4. 稲崎倫子, 青柳由美子, 米田哲也, 他. (2018). 富山衛研年報, 41, 75-77
5. 名古屋真弓, 嶋田嵩久, 板持雅恵, 他. (2019). 富山衛研年報, 42, 84-86
6. 厚生労働省健康局結核感染症課, 国立感染症研究所感染症情報センター (2019). 平成29年度感染症流行予測調査報告書, 117-144
7. 国立感染症研究所 (2017). 病原微生物検出情報, 38, 151-152
8. Obara M, Yamauchi T, Watanabe M, et al. (2011). Am. J. Trop. Med. Hyg., 84, 695-708




図 1. 令和元年度の年齢群別抗体保有率




図 2. 平成 26～30 年度の年齢群別抗体保有率




図 3. 令和元年度の年齢群別ワクチン接種歴

表 1. 年齢群別およびワクチン接種歴別の抗体保有率

年齢群 (歳)	接種歴あり			接種歴なし			接種歴不明			合計		
	陽性数/検査数	陽性率		陽性数/検査数	陽性率		陽性数/検査数	陽性率		陽性数/検査数	陽性率	
0～4	3 / 4	75.0%		3 / 31	9.7%		0 / 4	0%		6 / 39	15.4%	
0～2	0 / 0			3 / 28	10.7%		0 / 4	0%		3 / 32	9.4%	
3	2 / 3	66.7%		0 / 3	0%		0 / 0			2 / 6	33.3%	
4	1 / 1	100%		0 / 0			0 / 0			1 / 1	100%	
5～9	20 / 20	100%		1 / 3	33%		2 / 2	100%		23 / 25	92.0%	
10～14	21 / 21	100%		0 / 1	0%		0 / 0			21 / 22	95%	
15～19	13 / 13	100%		1 / 1	100%		2 / 2	100%		16 / 16	100%	
20～29	16 / 17	94.1%		2 / 2	100%		33 / 34	97.1%		51 / 53	96.2%	
30～39	3 / 4	75.0%		0 / 0			19 / 19	100%		22 / 23	95.7%	
40～49	0 / 1	0%		0 / 1	0%		7 / 23	30.4%		7 / 25	28.0%	
50～59	1 / 7	14%		0 / 0			3 / 14	21.4%		4 / 21	19.0%	
60～	2 / 2	100%		2 / 3	67%		4 / 13	30.8%		8 / 18	44.4%	
計	79 / 89	88.8%		9 / 42	21.4%		70 / 111	63.1%		158 / 242	65.3%	

9. 稲崎倫子, 嶋 一世, 渡辺 護, 他. (2015). 富山衛研年報, 38, 69-75
10. 佐賀由美子, 名古屋真弓, 稲崎倫子, 他. (2016). 富山衛研年報, 39, 69-75

11. 佐賀由美子, 稲崎倫子, 青柳由美子, 他. (2017). 富山衛研年報, 40, 68-74
12. 佐賀由美子, 稲崎倫子, 青柳由美子, 他. (2018). 富山衛研年報, 41, 68-74