

令和7年5月8日に公表した、「富山県がん疫学調査事業報告書」の「令和2年の状況」について、「令和2年の罹患概要」の内容に誤りがあったため、下記のとおり訂正いたしました。

修正箇所：p39,40の図5,6の全国値

修正内容：全国値を正しい数値に修正し、併せて説明文を修正。

正


4. 富山県のがんの罹患の特徴

令和2年の部位別の粗罹患率と年齢調整罹患率について、各年の厚生労働省 全国がん登録 罹患数・率報告において公表されている全国値との比較を示す。

粗罹患率は、男女ともに胃、大腸（結腸・直腸）、膵臓、肺、腎・尿路、悪性リンパ腫が全国値よりも高く、女性の乳房も全国値よりも高い（図5）。


年齢調整罹患率は、男性では胃、結腸、膵臓、肺、悪性リンパ腫が全国値よりも高く、前立腺は全国値よりも低い。女性では、胃、子宮体部、甲状腺、白血病が全国値よりも高く、大腸（結腸・直腸）、乳房、子宮頸部は全国値よりも低い（図6）。

図5 部位別粗罹患率：人口10万対（R2年、表1-Aから作成）



全国値は厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用

図6 部位別年齢調整罹患率：人口10万対（R2年、表1-Aから作成）



全国値は厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用

誤


4. 富山県のがんの罹患の特徴

令和2年の部位別の粗罹患率と年齢調整罹患率について、各年の厚生労働省 全国がん登録 罹患数・率報告において公表されている全国値との比較を示す。

粗罹患率は、男女ともに胃、大腸（結腸・直腸）、膵臓、肺、腎・尿路、悪性リンパ腫、が全国値よりも高い（図5）。


年齢調整罹患率は、男性では結腸、膵臓、肺、悪性リンパ腫が全国値よりも高く、胃、肝および肝内胆管、前立腺は全国値よりも低い。女性では、子宮体部、白血病が全国値よりも高く、大腸（結腸・直腸）、乳房は全国値よりも低い（図6）。

図5 部位別粗罹患率：人口10万対（R2年、表1-Aから作成）



全国値は厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用

図6 部位別年齢調整罹患率：人口10万対（R2年、表1-Aから作成）



全国値は厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率報告」より引用