

稲作管理特報

令和7年8月22日
入善産米品質向上対策本部
黒東地域農業技術者協議会

コシヒカリの適期刈取りについて

コシヒカリの出穂期は平年並で、今後の気温は平年より高めに推移する見込みです。

必ず籾の黄化状況を確認し、気象予報の降雨日に留意し、刈取適期内（籾黄化率85～90%）に刈取り、刈遅れによる胴割米が発生しないようにしましょう。

1 水管理

- ・ **刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、**稲体の活力維持と登熟向上に努めましょう。
ただし、フェーンなど高温が予想される場合は、**予め入水**しましょう。
- ・ **地域全体の用水が不足していますので、かけ流しは絶対に止めてください。**

2 雑草（クサネム等）の拔取り

- ・ **クサネムの雑草種子は、調製作業で取り除くことが困難であり、製品に混入すると農産物検査で格落ちの要因となるので、刈取り前に必ず雑草を拔取りましょう。**

3 コシヒカリの刈取時期

- ・ 地域や生育状況により成熟期に差があります。
籾の黄化状況を確認し、刈取りましょう。
- ・ 刈遅れによる胴割米の発生防止のため、**適期内に刈り終えましょう。**

【刈取適期の目安】※籾黄化率 85%の時

出穂期	刈取適期
7月31日	9月7日頃
8月2日	9月10日頃
8月6日	9月14日頃

- ・ **特に、大規模経営体では、適期内に刈り終わられるよう、刈取開始時期を2日程度早め（籾黄化率 80%）、遅れないよう刈取りを開始しましょう。**

【刈取適期の穂における籾黄化状況】

※矢印で示す点線内の籾が黄化した時
が籾黄化率85%で刈取適期



4 乾燥・玄米水分

- ・ 胴割米の発生を防ぐため**乾燥速度は毎時 0.8%以下**を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・ **初期の籾水分が高い場合（25%以上）や低い場合（20%未満）は、二段乾燥の実施や送風温度を下げるなど、特に丁寧な乾燥を行いましょう。**
- ・ 青米の混入程度により停止水分を設定しましょう。

【乾燥機停止水分の目安】

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く（-0.5%）	変わらない	もどる（+0.5%）

- ・ **玄米水分は 14.5～15.0%に仕上げましょう。**玄米水分が 17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう（フレコン出荷の場合は 14.0～14.5%）。
- ・ **出荷前に栽培記録簿を提出してください。**

秋の農作業安全運動 8月20日～10月20日

詰まったワラを取除く時はエンジンを止める！
後進時には補助者による誘導や確認を心がける！

【刈取適期札について】

- ・ 刈取適期（籾黄化85%予測日）を記載します。
- ・ 記載日より2日程度早く刈り始めることができます。