

稲作管理特報

令和8年8月20日
朝 日 町
黒東地域農業技術者協議会

コシヒカリの適期刈取りについて

コシヒカリの出穂期は平年より7日程度早く、今後の気温も平年より高めに推移する見込みです。このため、必ず①籾の黄化状況を確認し、②気象予報の降雨日に留意し、③籾黄化率が80～85%から刈取りを始め、④刈遅れによる胴割米が発生しないようにしましょう。

1 水管理

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力維持と登熟向上に努めましょう。ただし、フェーンが予想される場合は、予め入水しましょう。
- ・地域全体の用水が不足していますので、かけ流しは絶対に止めてください。

2 雑草（クサネム等）の拔取り

- ・クサネムの雑草種子は、調製作業で取り除くことが困難であり、製品に混入すると農産物検査で格落ちの要因となるので、刈取り前に必ず雑草を抜取りましょう。


3 コシヒカリの刈取時期

- ・地域や生育状況により成熟期に差があります。
籾の黄化状況を確認し、適期に刈取りましょう。
- ・刈遅れによる胴割米が発生しないよう、適期内に刈り終えましょう。

【刈取時期の目安】※籾黄化率80～85%の時

出 穂 期	刈取時期	
	籾黄化率80%	籾黄化率85%
7月25日	8月30日頃	9月1日頃
7月27日	9月1日頃	9月3日頃
7月29日	9月3日頃	9月5日頃

刈取適期の穂における籾黄化状況
※矢印で示す点線内の籾が黄化した時
が籾黄化率85%で刈取適期



- ・大規模経営体では、刈取開始時期を籾黄化率80%とし、刈遅れな
いようスタートして下さい。

4 乾燥・玄米水分

- ・胴割米の発生を防ぐため乾燥速度は毎時0.8%以下を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・初期の籾水分が高い場合（25%以上）や低い場合（20%未満）は、二段乾燥の実施や送風温度を下げるなど、特に丁寧な乾燥を行いましょう。

【乾燥機停止水分の目安】～青米の混入程度により停止水分を設定しましょう～

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く（-0.5%）	変わらない	もどる（+0.5%）
乾燥機停止水分	15.0～15.5%	14.5～15.0%	14.0～14.5%

- ・玄米水分は14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう。
※フレコン出荷の場合は14.0～14.5%に仕上げてください。
- ・出荷前に栽培記録簿を提出してください。

「秋の農作業安全運動（8月20日～10月20日）」
詰まったワラを取除く時はエンジンを止める！
後進時には補助者による誘導や確認を心がける！

【刈取適期札について】

- ・刈取適期（籾黄化率85%予測日）を記載します。
- ・記載日より2日程度早く刈り始めることができます。