

富富富 特報

JAみな穂「富富富」ブランド化推進協議会



「胴割米」の発生を防ぐため、適切な水管理や適期の刈取り、適正な乾燥調製を行い、高品質な「富富富」に仕上げましょう！

1. 刈取りまでの水管理

～落水を急がない！～

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力を維持し胴割米の発生を防ぎましょう。ただし、フェーン等の高温が予想される場合は、事前に入水しましょう。

2. 適期刈取り

～籾黄化率を確認して、適期に刈取る！～


- ・青米の混入や胴割米の発生を防ぐため、籾黄化率 80%を目安に刈取りを始め、籾黄化率 90%までに刈り終えましょう。

※富富富はコシヒカリに比べ、籾の黄化にバラツキが出やすく、籾黄化率 90%を超えると、胴割米の発生が急増するので刈り遅れに注意しましょう。

【刈取時期の目安】※籾黄化率 80%

出穂期	刈取適期
7月27日	9月5日～8日頃
7月31日	9月10日～13日頃
8月4日	9月14日～17日頃

※ライスセンターへの籾の持込日については、事前にお問い合わせください。



●: 黄化
○: 黄化直前
○: 緑色

【刈取始期の穂における籾黄化状況】
※矢印で示す穂内の籾が黄化した時が
籾黄化率 80%で刈取開始の目安

3. 乾燥・調製

～「過乾燥」による胴割米の発生防止～

- ・胴割米の発生を防ぐため、乾燥速度は毎時 0.8%以下を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・水分ムラによる胴割米の発生を防ぐため、初期の籾水分が高い場合（25%以上）の二段乾燥や、低い場合（20%以下）は送風温度を下げるなど、丁寧な乾燥に努めてください。
- ・青米の混入が多いので、水分の戻りに注意して停止水分を設定しましょう。

【乾燥機停止水分の目安】

100粒中の青米粒数	0～5粒	6～10粒	11粒以上
乾燥機停止後の水分変化	乾く (-0.5%)	変わらない	もどる (+0.5%)
乾燥機停止水分	15.0～15.5%	14.5～15.0%	14.0～14.5%

- ・玄米水分は 14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が 17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう（フレコン出荷の場合は 14.0～14.5%）。
- ・1.9mmのふるい目を必ず使用し、選別の徹底で未熟粒の混入を防ぎましょう。
- ・色彩選別機を整備している経営体は積極的に活用しましょう。

※適期刈取りや乾燥調製作業、ライスセンターの利用、出荷時の注意事項等の詳細については、令和8年度産米改良座談会資料をご確認ください。

出荷前に、化学合成農薬の成分使用回数(12以内)を確認し、栽培記録簿を提出してください。また、令和9年産「富富富」の作付拡大をお願いします。