

## コシヒカリの適期刈取りについて

コシヒカリの出穂期は平年並で、今後の気温は平年より高めに推移する見込みです。  
**必ず籾の黄化状況を確認し、気象予報の降雨日に留意し、刈取適期内(籾黄化率85～90%)に刈取り、刈遅れによる胴割米が発生しないようにしましょう。**

### 1 水管理

- ・刈取りの5～7日前まで間断かん水を行い、稲体の活力維持と登熟向上に努めましょう。  
ただし、フェーンなど高温が予想される場合は、予め入水しましょう。
- ・地域全体の用水が不足していますので、かけ流しは絶対に止めてください。

### 2 雑草(クサネム等)の拔取り

- ・クサネムの雑草種子は、調製作業で取り除くことが困難であり、製品に混入すると農産物検査で格落ちの要因となるので、刈取り前に必ず雑草を拔取りましょう。

### 3 コシヒカリの刈取時期


- ・地域や生育状況により成熟期に差があります。  
籾の黄化状況を確認し、刈取りましょう。
- ・刈遅れによる胴割米の発生防止のため、適期内に刈り終えましょう。

【刈取適期の目安】※籾黄化率85%の時

| 出穂期   | 刈取適期   |
|-------|--------|
| 7月31日 | 9月7日頃  |
| 8月2日  | 9月10日頃 |
| 8月6日  | 9月14日頃 |

刈取適期の穂における籾黄化状況  
※矢印で示す点線内の籾が黄化した時  
が籾黄化率85%で刈取適期

- ：黄化
- ⦿：黄化直前
- ：緑色



- ・特に、大規模経営体では、適期内に刈り終わられるよう、刈取開始時期を2日程度早め(籾黄化率80%)、遅れないよう刈取りを開始しましょう。

### 4 乾燥・玄米水分

- ・胴割米の発生を防ぐため乾燥速度は毎時0.8%以下を基本とし、ゆっくりと乾燥しましょう。
- ・初期の籾水分が高い場合(25%以上)や低い場合(20%未満)は、二段乾燥の実施や送風温度を下げるなど、特に丁寧な乾燥を行いましょう。
- ・青米の混入程度により停止水分を設定しましょう。

【乾燥機停止水分の目安】

| 100粒中の青米粒数  | 0～5粒      | 6～10粒 | 11粒以上      |
|-------------|-----------|-------|------------|
| 乾燥機停止後の水分変化 | 乾く(-0.5%) | 変わらない | もどる(+0.5%) |

- ・玄米水分は14.5～15.0%に仕上げましょう。玄米水分が17%以下になったら、手動水分計でこまめに測定し、過乾燥米の発生を防止しましょう(フレコン出荷の場合は14.0～14.5%)。
- ・出荷前に栽培記録簿を提出してください。

### 秋の農作業安全運動 8月20日～10月20日

詰まったワラを取除く時はエンジンを止める！  
後進時には補助者による誘導や確認を心がける！

### 【刈取適期札について】

- ・刈取適期(籾黄化85%予測日)を記載します。
- ・記載日より2日程度早く刈り始めることができます。