

富富富 管理特報

令和 8 年 7 月 1 3 日

JAみな穂「富富富」ブランド化推進協議会

1 JAみな穂管内の富富富の生育状況（7/7 現在）

富富富の草丈は長く、茎数は多く、葉令の進みは早くなっています。気温が高く推移しており、幼穂形成期は平年より4日程度早くなる見込みです。

年度	田植日	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉令	葉色	幼穂形成期 (予測)	出穂期 (予測)
R 8	5/14	59.0	603	11.8	4.1	(7/10)	(8/2)
R 7	5/14	66.1	577	11.7	4.0	7/15	8/6
平年	5/14	58.0	587	11.4	4.1	7/14	8/6

2 水管理

①幼穂形成期まで

⇒コシヒカリと同程度の落水期間で、間断かん水を行い
葉色 4.0 程度に誘導。

②幼穂形成期～出穂期

⇒ 入水の間隔を短くし、常に足跡や溝に水が残る程度の状態を維持する飽水管理で稲体の活力を維持。

③出穂期～出穂後 20 日間

⇒田面が露出しない程度の湛水管理で稲体の活力を維持。

④刈取り 5～7 日前まで

⇒湛水と落水を繰り返す間断かん水で収穫まで稲体の活力を維持。



干し過ぎない！

熱中症予防をしましょう

こまめな
休憩と
水分補給！



飽水管理



飽水



湛水




落水

【生育ステージ】

【溝掘り・中干し】

【水管理】




3 穂肥対応

・近年、出穂後の高温が続いており、基肥一発肥料でも葉色が淡くなるほ場がみられます。

出穂8日前（7/25頃）の葉色が4.2未満の場合、走り穂頃までに追肥3号で5～7kg/10a施用し、穂揃期の葉色を4.4に誘導しましょう。

ただし、葉色が濃い場合、追加穂肥を施用すると、屑米やタンパク含有率が増え、収量、品質、食味が悪くなります。事前に葉色を確認して穂肥判断を行ってください。



【出穂8日前の富富富の姿】

4 防除

出穂期が8月2日頃の場合・・・ほ場の出穂状況に応じて対応してください

防除時期	1回目 走り穂（7/30頃）		2回目 穂揃期（8/6頃）	
	10a 当たり散布量		10a 当たり散布量	
粉剤体系	ブラシントレバリダ粉剤 DL		ラブサイドキラップ粉剤 DL	
	4kg（3成分）		4kg（2成分）	
液剤体系	乗用管理機	スタークル液剤10+モンカットフロアブル 1,000倍+1,000倍/100ℓ （2成分）	ラブサイドK2フロアブル	1,000倍/100ℓ （2成分）
	ドローン	スタークル液剤10+モンカットフロアブル 8倍+8倍/0.8ℓ（2成分）	ラブサイドK2フロアブル	8倍/0.8ℓ（2成分）

- ・防除(成分数)にあたり、農薬の成分使用回数12以内を厳守してください。
- ・苗箱施薬剤としてアレスモンガレス箱粒剤を施用された方は、紋枯病が発生していなければ1回目のモンカットフロアブルを省略できます。
ご不明な場合は指導機関にご相談ください。
- ・無人ヘリ防除は、コシヒカリと同様の防除を予定しています。

★JA みな穂では営農情報を配信しています。
・営農メール: 水稻栽培情報、気象・災害情報
・LINE: 稲作管理特報などの各種特報
※右の二次元コードを読み込み、案内に沿って手続きして下さい。

営農
メール

LINE



JA みな穂営農センター（中央支店）TEL74-2440
JA みな穂南部支店経済課 TEL78-1167
新川農林振興センター農業普及課 TEL52-0094

JA みな穂西部支店経済課 TEL72-1162
JA みな穂あさひ支店経済課 TEL83-3212