

農作業特報


黑 部 市 農 業 技 術 會 議

早期に分けつを確保すると、品質の良い米作りにつながります。活着後は、浅水管理によって田水温を高め、分けつ（新しい茎）の発生を促しましょう。昼夜の水温較差が大きいと、分けつの発生が促進されます。

また、田植後4週間までの中干しに備え、田植時期の早いほ場から溝掘りを始めましょう。

1. 水管理

- 活着後は、浅水管理（水深3cm程度）を徹底しましょう。
 - 入水は朝・夕に行い、日中は止め水で水温を高め、分けつ（新しい茎）の発生を促し、太い茎を確保しましょう。
 - 田がわいたり、藻が発生した場合は、水の入れ替えや軽い田干しを行い、根に酸素を与えるましょう。
 - 軽い田干しを行う場合は、風の穏やかな温かい日に実施しましょう。
 - [• 一発除草剤を散布済みの場合 → 軽い田干しは散布後7日以降に]
 - [• 中期除草剤を散布予定の場合 → 軽い田干しは散布前に]
 - × チラ干しは、苗が傷んだり、雑草が発生しやすくなるため、厳禁です。
 - × 深水管理は、水温が上がりず、苗が伸び過ぎて軟弱になってしまいます。




間ざし苗は、いもち病発生のとも！すぐに処分しましょう!!

春の農作業安全運動展開中！ 4月1日～5月31日

2. 溝掘り

- 中干しの効果を高めるため、6月上旬までに溝掘りを実施しましょう。
 - 溝掘り前に軽い田干しを行い、土を落ち着かせた後に設置しましょう。
〔 設置の目安は『額縁』 + 『5m程度の間隔に 1 本』。
“水の溜まっているところ” や “乾きにくいところ” を重点的に。〕
 - 掘った溝は、確実に水尻（排水口）と連結しましょう。



3. 中期除草剤の使用のポイント

薬剤名	処理時期	使用量	使用上の注意点
※サンパンチ 1キロ粒剤	田植後 15~30 日 (ノビエ 3.5 葉期まで) 収穫 60 日前まで	1kg／10a	・イネ4葉期以前に使用しない。
※テッケン ジャンボ	田植後 15~30 日 (ノビエ 4 葉期まで) 収穫 60 日前まで	500g(10 パック) ／10a	・水深6cm以上の深水状態で水田に均等に投げ入れる。 ・藻が多発しているほ場では使用しない。
※アクシズ MX 1キロ粒剤	田植後 20 日～ (ノビエ 4 葉期まで) 収穫 45 日前まで	1kg／10a	・薬害回避のため、田植後20日以降に散布する。
マメットSM 1キロ粒剤	田植後 20~30 日 (ノビエ 3.5 葉期まで) 収穫 60 日前まで	1kg／10a	・イネ5葉期以前に使用しない。 ・15℃以下の低温または30℃以上の高温が予想される場合は使用しない。
※レプラス 1キロ粒剤	田植後 14~30 日 (ノビエ 4 葉期まで) 収穫 60 日前まで	1kg/10a	・薬害回避のため、砂質土壤及び減水深2cm/日以上の水田、極端な浅植えの水田での使用は避ける。

- ※印は「やまだわら」には使用しない。
 - 敷布前に、軽い田干しや水の入れ替えを行いましょう。
 - 敷布時は田面が見えない程度の深水とし、散布後7日間は「止め水」を保ち、落水やかけ流しはやめましょう。